

## Nati nel 2017

3° mese

**1° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),  
Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

**1° dose: pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco;  
non obbligatorio)

dopo circa 15 giorni

3° mese

**1° dose: meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B)

5° mese

**2° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),  
Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

**2° dose: pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco;  
non obbligatorio)

dopo circa 15 giorni

5° mese

**2° dose: meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B)

7° mese

**3° dose: meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B)

11° mese

**3° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),  
Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

**3° dose: pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco;  
non obbligatorio)

13°-15° mese

**1° dose: morbillo, parotite, rosolia, varicella** (vaccino tetravalente)  
**meningococco C** (vaccino contro la meningite di tipo C)

15°-18° mese

**4° dose: meningococco B** (vaccino contro la meningite di tipo B)